

アトメディックローション

第3類医薬品

この説明文書は、本剤のご使用前に必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

日やけによる炎症をはじめ湿疹や皮ふ炎は、かゆみ、皮ふの赤みや腫れ、さらにはただれなどの症状を伴います。

一般に、日やけなどによるほてりをしずめる方法としては、クールダウン効果と保湿効果をあわせ持つ化粧水、乳液及びマスクなどが使用されています。

また、皮ふの赤みや腫れには、カラミンや副腎皮質ホルモンを配合した医薬品などが用いられます。

アトメディックローションには、皮ふの炎症症状をおさえ、患部を乾燥させて保護する成分が配合されていますので、日やけ、皮ふ炎、湿疹、ただれ、あせも、かぶれなどを効果的にしずめます。

アトメディックローションの特長

- カラミン配合なので、日やけ後の患部の炎症をしずめ、乾燥させ保護します。
- 皮ふの赤みや腫れなどに効果を発揮します。
- パウダー入りのローションなので、夏でもべたつかないさらっとした使用感です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 湿疹やただれのひどい人



2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効 能

日焼け、皮膚炎、湿疹、ただれ、あせも、かぶれ、じんましん蕁麻疹

用法・用量

1日数回、よくふりまぜてから適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 使用前によくふりまぜてください。


成分と作用

| 成 分 | 分量(1g中) | 作 用 |
|---------------|---------|----------------------------|
| カラミン | 80mg | ・皮ふの収れん・消炎・保護作用を有します。 |
| 酸化亜鉛 | 20mg | ・創面を乾燥させます。 |
| ジフェンヒドラミン | 10mg | ・抗ヒスタミン作用を有し、かゆみ、赤みをしずめます。 |
| グリチルリチン酸二カリウム | 5mg | ・消炎作用を有し、腫れ、赤みをしずめます。 |

添加物として、流動パラフィン、シリコン油、ゲラニオール、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、1,3-ブチレングリコール、硫酸亜鉛、ベントナイト、パラベン、dl-カンフルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 衣類などに付着しないよう注意してください。万一付着した場合には、水又は洗剤でなるべく早く洗い落としてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



包 装

100g

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

杏林製薬株式会社 学術部

電話 03(3293)3412

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

製造販売元 株式会社 資生堂
東京都中央区銀座7-5-5