

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

COOLONE

かぜ薬

熱、のどの痛み、たん、鼻水、鼻づまりに! イブプロフェン配合のかぜ薬

# クールワン<sup>®</sup>かぜゴールド

第②類  
医薬品

「クールワンかぜゴールド」は熱・のどの痛み等に効くイブプロフェン、鼻水・鼻づまり等に効くクレマスチンフマル酸塩、たんを出しやすくするブロムヘキシン塩酸塩など6種類の有効成分を配合し、かぜの諸症状を緩和します。

## ! 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 15歳未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。)

\* 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。

5. 服用時は飲酒しないでください。

6. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人: 高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人: 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
- (8) 次の病気にかかったことのある人: 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステアファン・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
腎障害	尿量が減り、全身のむくみ及びこれらに伴って息苦しさ、だるさ、悪心・嘔吐、血尿・蛋白尿等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首筋のつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状はかぜの症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

便秘、口のかわき、下痢

## 効 能

かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## 用法・用量

下記の1回服用量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

### <用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分・分量


白色～帯黄白色のフィルムコーティング錠で、9錠(大人1日量)中に次の有効成分を含んでいます。

成 分	含量(9錠)	作 用
イブプロフェン	450mg	のど、関節、筋肉、頭などの痛みをしずめ、熱を下げます。
クレマスチンフマル酸塩	1.34mg	鼻水、くしゃみをおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	22mg	せきの中枢にはたらい、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を広げせきをしずめます。
プロムヘキシン塩酸塩	12mg	たんを出しやすくします。
無水カフェイン	75mg	かぜにともなう頭痛をやわらげ、すっきりとさせます。

添加物として、セルロース、無水ケイ酸、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

杏林製薬株式会社 くすり情報センター  
電話 03(3293)3412  
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)