

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

COOLONE CAPSULE

持続性鼻炎治療薬

アレルギー性鼻炎・急性鼻炎によるくしゃみ・鼻水・鼻づまりに!

クールワン®持続性鼻炎カプセル

第②類医薬品

最近、自然環境や生活環境の著しい変化に伴いアレルギー症状を訴える人が増えています。くしゃみ、鼻水、鼻づまりはかぜの症状だけでなく、花粉やハウスダスト等によるアレルギー性の鼻炎等によっても引き起こされます。

〈クールワン持続性鼻炎カプセル〉は、抗アレルギー作用を持つ生薬成分の細辛を配合し、早く溶ける顆粒とゆっくり溶ける顆粒を一つのカプセルに詰め、大人1回2カプセル・1日2回(朝・夕)服用する持続性の鼻炎治療薬です。

! 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 次の症状がある人
前立腺肥大による排尿困難
 - (3) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人
緑内障
 - (8) モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
そ の 他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき、便秘

効 能

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量

下記の1回服用量を1日2回(朝・夕)に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人(15才以上)	2 カプセル	2回(朝・夕)
7才以上15才未満	1 カプセル	
7才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



有効成分


4カプセル(大人の1日量)中、次の有効成分を含んでいます。

有効成分	含量(4カプセル)	作用
塩酸ブソイドエフェドリン	120 mg	末梢血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれを抑え、鼻づまりを緩和します。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	8 mg	抗アレルギー作用により、くしゃみ・鼻水を抑えます。
無水カフェイン	100 mg	鼻炎にともなう頭重を和らげます。
サイシン乾燥エキス (原生薬として 400mg)	40 mg	抗アレルギー作用により、くしゃみ・鼻水を抑えます。
ペラドンナルカロイド	0.4mg	鼻汁の分泌を抑制して、鼻水、なみだ目を抑えます。

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、カプセル本体に黄色5号、緑色3号、酸化チタン、ラウリル硫酸Na、ゼラチン含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。



★アレルギー性鼻炎の一般的注意

- 1.室内、ふとんの清掃
- 2.室内などの換気・乾燥・除湿
- 3.規則正しい生活、十分な休養・睡眠
- 4.適度な運動
- 5.バランスのよい食生活(片寄らないこと)
- 6.酒、タバコ、辛いものはさける。
- 7.スギ花粉の場合

- (1)最も多く飛散、落下するといわれている時間帯(例えば夕方)には、外出をさける。
- (2)外出時はマスク、メガネ、帽子を着用

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

杏林製薬株式会社 学術部

電話 03(3293)3412

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)