

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コルベロン鎮痛薬
2	成分・分量	2錠(大人1日量)中の有効成分: イソプロピルアンチピリン 150mg、エテンザミド 250mg、カフェイン 50mg、 乾燥水酸化アルミニウムゲル 70mg
3	用法・用量	・1日3回を限度とし、大人(15歳以上)は1回2錠、8歳以上15歳未満は1回1錠を なるべく空腹時をさけて服用 ・服用間隔は4時間以上おいてください。 ・8歳未満は服用しない
4	効能・効果	頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・ 打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛 悪寒・発熱時の解熱
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	してはいけないこと 1. 次の人は服用しないでください。 (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3. 服用時は飲酒しないでください。 4. 長期連用しないでください。 次の人は服用前にご相談ください。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いの ある小児(15歳未満) (4)高齢者 (5)本人又は家族がアレルギー体質の人 (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (7)心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍の診断を受けた人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師
または登録販売者にご相談下さい。