

E P I A M A R T S

外用皮膚・湿疹用剤

非ステロイド系抗炎症剤、ウフェナマート配合
皮膚炎 湿疹 ただれ あせも かぶれ かゆみに

エピアマートS

第2類医薬品

湿疹・皮膚炎は、外からの様々な刺激やアレルギー反応などが原因となり、皮膚に炎症が起こった状態です。湿疹・皮膚炎には、まずその原因となる刺激を除去することが大切です。また、かゆみを伴う場合、かきむしることにより、更に症状を悪化させることがありますので、早めに治療することが大切です。

エピアマートSは、非ステロイド系抗炎症剤ウフェナマートに、かゆみをおさえる成分を配合していますので、皮膚炎、湿疹、かゆみ等を効果的にしずめます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 湿潤やただれのひどい人



2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 刺激感（ヒリヒリ感）、熱感、乾燥感

- (2) 1～2週間くらい使用しても症状の改善がみられない場合、または症状の悪化がみられた場合

効 能

皮膚炎、湿疹、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、おむつかぶれ


用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

- (3) 外用にのみ使用してください。
 (4) チューブの開け方(右図)
 キャップを逆さにして、チューブの
 口元に強く押し当ててください。



成分・分量


1g中に以下の成分及び分量を含有しています。

成分	分量	はたらき
ウフェナマート	50mg	皮膚炎、湿疹等の炎症症状をおさえます
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみや皮膚の炎症をしずめます
グリチルレチン酸	3mg	皮膚炎、湿疹等のかゆみや炎症をおさえます

添加物として、流動パラフィン、ワセリン、ステアリルアルコール、ベヘン酸、シリコン油、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ステアリン酸ポリオキシシル、ステアリン酸グリセリン、パラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

杏林製薬株式会社 学術部
 電話 03(3293)3412

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)