

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ガストリック10
2	成分・分量	1錠(成人1回量)中の有効成分:ファモチジン 10mg
3	用法・用量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれた時、成人(15歳以上、80歳未満) 1回1錠、1日2回まで、水又はお湯で服用</li> <li>・小児(15歳未満)、高齢者(80歳以上)は服用しない</li> <li>・服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1錠服用してください。</li> <li>・症状が治まった場合は、服用を止めてください。</li> <li>・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談してください</li> <li>・2週間を超えて続けて服用しないでください</li> </ul>
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>してはいけないこと</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次の人は服用しないでください。             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)ファモチジン等のH<sub>2</sub>ブロッカー薬によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、のど・まぶた・口唇等のはれ)を起こしたことがある人</li> <li>(2)医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人 血液の病気、腎臓・肝臓の病気、心臓の病気、胃・十二指腸の病気、喘息・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤</li> <li>(3)医師から赤血球数が少ない(貧血)、血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人</li> <li>(4)小児(15歳未満)及び高齢者(80歳以上)</li> <li>(5)妊婦又は妊娠していると思われる婦人並びに授乳婦</li> </ol> </li> <li>2. 本剤を服用している間は、他の胃腸薬を服用しないでください。</li> </ol> <p>次の人は服用前にご相談してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人</li> <li>(2)本人又は家族がアレルギー体質の人</li> <li>(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>(4)高齢者(65歳以上)</li> <li>(5)のどの痛み、咳及び高熱、原因不明の体重減少、持続性の腹痛のある人</li> </ol>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。