

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ミルトン
2	成分・濃度	次亜塩素酸ナトリウム 1.1W/V%
3	用法・用量	・哺乳びん、乳首の消毒・殺菌；約80倍にうすめ、1時間以上浸す。 ・手指、皮ふの消毒・殺菌；約20倍にうすめて用いる。 ・ガーゼ、包帯、衛生器具等の消毒・殺菌；約10－50倍にうすめ、15分以上浸す。 ・器具等の消毒・殺菌；約80倍にうすめ、1時間以上又は約10－50倍にうすめ、15分以上浸す。
4	効能・効果	哺乳びん、乳首、手指、皮ふ、ガーゼ、包帯、衛生器具等、器具等の消毒・殺菌
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤は飲まないでください。 本剤をあやまって飲み込んだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、医師にご相談ください。 2. 目に入らないように注意してください。 目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医に相談してください。 3. 小児の手の届かない所に保管してください。 4. 手の荒れやすい方は、取扱い時に炊事用手袋などをご使用ください。 ミルトン溶液との接触により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。