

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

SEN MORI

鎮咳去痰薬

せき・たんに 去痰薬L-カルボシステイン配合

センモール® 咳止め

第2類  
医薬品



せきの発作やのどにからまる粘稠なたんは、苦痛でわずらわしいものです。  
ことにせきが長く睡眠や安静が妨げられ、体力の消耗を招き、症状の回復を遅らせたり、余病を併発することも少なくありません。

センモール咳止めは、せきとたんに効果のある薬です。

**!** 使用上の注意

**⊗** してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。  
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気があらわれることがあります。)
- \* 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 高齢者
  - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (6) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	腹痛、悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

口のかわき、便秘、下痢

## 効能

せき、たん

## 用法・用量

下記の1回服用量を1日3回食後に服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
8～14歳	2錠	
8歳未満	服用しないでください	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



## 成分・分量


白色のフィルムコーティング錠で、12錠（大人1日量）中に次の有効成分を含んでいます。

成分	含量(12錠)	作用
L-カルボシステイン	750mg	のどにからんだ粘稠なたんを排出しやすい流動的な状態にするとともに、気道粘膜を正常化して、たんの排出を促します。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢に働いて、せきをしずめます。
ノスカピン	60mg	
dI-メチルエフエドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性のせきをしずめます。

添加物として、セルロース、無水ケイ酸、カルメロースCa、ポビドン、タルク、ステアリン酸Mg、乳糖、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



★せき、たんを早く治すために、次の点にもご注意ください。

- 栄養・睡眠を十分にとり、体力の消耗を防ぎましょう。
- 室内の空気の乾燥やホコリなどに気をつけましょう。
- 喫煙は避けましょう。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

杏林製薬株式会社 くすり情報センター  
電話 03(3293)3412

受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日を除く)