

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

SENMORL

鼻炎用内服薬

くしゃみ・鼻水・鼻づまりに

センモール鼻炎カプセル

第②類医薬品

センモール鼻炎カプセルは、抗ヒスタミン剤トリプロリジン塩酸塩水和物にdl-メチルエフェドリン塩酸塩、ベラドンナ総アルカロイド、リジチーム塩酸塩などを配合した鼻炎用内服薬です。これらの成分により、急性鼻炎やアレルギー性鼻炎などのくしゃみ、鼻水、鼻づまりに効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 高齢者
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (7) 次の症状のある人 高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。



- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
その他	排尿困難、顔のぼてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様のみずぶくれなどの激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

口のかわき、便秘

効 能

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

用法・用量

次の量をなるべく食後30分以内に服用してください。

年 令	1回服用量	1日服用回数
15歳以上(大人)	1 カプセル	3回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成分・分量

3カプセル(大人の1日量)中、次の有効成分を含んでいます。

成 分	含 量	働 き
トリプロリジン塩酸塩水和物	6mg	アレルギー性のくしゃみ、鼻水、鼻づまりやなみだ目によく効きます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	90mg	鼻粘膜の充血をしずめ、鼻づまりによく効きます。
ベラドンナ総アルカロイド散20%	3mg	粘液の分泌をおさえ、鼻水、なみだ目を改善します。
リゾチーム塩酸塩	60mg	鼻炎による腫れをしずめます。
無水カフェイン	150mg	鼻炎にともなう頭重をやわらげ、すっきりとさせます。

添加物として、バレイシヨデンプン、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、ゼラチン、ラウリル硫酸Na、亜硫酸水素Na、トウモロコシデンプン及び酸化チタンを含有します。

保管及び取り扱い上の注意


(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

(4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



★アレルギー性鼻炎の一般的注意

1. 室内、ふとんの清掃

2. 室内などの換気・乾燥・除湿

3. 規則正しい生活、十分な休養・睡眠

4. 適度な運動

5. バランスのよい食生活(片寄らないこと)

6. 酒、タバコ、辛いものはさける。

7. スギ花粉の場合

(1) 最も多く飛散、落下するといわれている時間帯(例えば夕方)には、外出をさける。

(2) 外出時はマスク、メガネ、帽子を着用

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

杏林製薬株式会社 学術部

電話 03(3293)3412

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元

杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

製造販売元

共栄製薬工業株式会社
富山県高岡市中田4576