

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	トリベミン錠
2	成分・分量	4錠(大人1日量)中の有効成分: メクリジン塩酸塩 50mg、スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.2mg、 無水カフェイン 40mg
3	用法・用量	<ul style="list-style-type: none"> ・乗物酔いの予防には、乗車船30分前に大人(15歳以上)は1回2錠、7歳～14歳は1回1錠、5歳～6歳は1回1/2錠を服用 必要に応じて追加服用する場合には、4時間以上の間隔をおいて服用 ・1日の服用回数は2回を限度 ・本剤は、かみ砕いて服用することもできる。 ・5歳未満は服用しない。
4	効能・効果	乗物酔いによるめまい・はきけ・頭痛の予防及び緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>してはいけないこと</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬) 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 <p>次の人は服用前にご相談ください。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 排尿困難の症状のある人 (7) 緑内障、心臓病の診断を受けた人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。